

BANKIT®

Fungicida
Suspensión concentrada

ACCIÓN FITOSANITARIA: Bankit® combate la Sigatoka Negra en los cultivos de Banano y Plátano.

NOMBRE COMÚN: Azoxistrobina.

FORMULACIÓN Y CONCENTRACIÓN: Suspensión concentrada que contiene 250 gramos de ingrediente activo por litro de producto formulado.

RECOMENDACIONES PARA SU USO: Aplicar Bankit® como un tratamiento preventivo, para ayudar a mantener bajos los niveles de infección. No aplicarlo como un tratamiento de rescate, cuando ya se ha perdido el control, y los niveles de infección sean altos.

MODO DE EMPLEO: Previo a la aplicación, los equipos deben ser calibrados, para dar una distribución homogénea del preparado.

Para aplicaciones aéreas:

- Verter la cantidad de aceite agrícola necesaria en el tanque de la mezcladora. Sobre el aceite agrícola en constante agitación añadir el emulsificante **AL - 100** a la dosis de 0.2 l/ha. Agitar por 5 minutos. Finalmente, sobre esta mezcla en agitación, añadir 0.4 l/ha de Bankit®, agitar 5 minutos más, y la mezcla estará lista para usarse. No excederse del tiempo recomendado.

Para aplicaciones terrestres (60 – 80 l/ha):

- Verter aceite agrícola (8 – 10 l/ha) + Terco (8 – 10 ml/ha), agitar bien por 5 minutos, luego agregar Bankit® (0.4 l/ha). Completar con agua hasta llegar al volumen de 60 – 80 l/ha.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Aplicar Bankit® durante los meses de lluvia, cada 14 – 21 días si el nivel de infección es alto o moderado. También se lo puede aplicar en época seca. Se ha establecido un período libre de uso de Bankit® desde septiembre hasta noviembre. Se podrán hacer un máximo de 4 aplicaciones/año.

PERÍODO DE REINGRESO: Tan pronto como el material de aspersión se seque.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de plaguicidas con excepción de los productos alcalinos.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Evitar el contacto con la piel y los ojos. Evitar la inhalación de la niebla de solución.
- No comer, beber o fumar durante la preparación y utilización del producto.
- Usar ropa adecuada, por ejemplo guantes, delantal, overol, botas, tapaboca y careta de protección.
- Antes de comer, beber o fumar sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua.

INSTRUCCIONES DE USO DE BANKIT®:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (l/ha)	P.C.
	Nombre Común	Nombre Científico		
BANANO Y PLÁTANO (Musa spp.)	Sigatoka negra	Mycosphaerella fijiensis	0.4	0

P.C.: Período de Carencia

FRASES DE ADVERTENCIA:

- No contaminar cuerpos de agua (acequias, ríos, canales, etc.) con los desechos o envases vacíos.

- No almacenar junto con alimentos, bebidas o semillas para consumo humano o animal.
- Conservar el producto en el envase original y herméticamente cerrado.
- No utilizar este envase para algún otro fin. Antes de destruir el envase, enjuáguelo con agua (cuarta parte del contenido), por lo menos tres veces y vierta los residuos en el equipo de aspersión (aplicación).
- En caso de derrame cubrir el producto con material absorbente como arena, tierra o aserrín, recoger el material en un envase cerrado herméticamente y dispóngalo de acuerdo a la normativa local.

PRIMEROS AUXILIOS Y CONSEJOS PARA LOS MÉDICOS:

En caso de intoxicación accidental por: **Inhalación:** Alejar al paciente de la exposición, mantener el calor del cuerpo y mantenerlo en reposo. Acudir al médico si se producen efectos adversos. **Ingestión:** Si se traga acudir inmediatamente a un médico y mostrarle el envase y la etiqueta. Si el paciente está consciente, lavarle la boca con agua. No provocar vómito. **Contacto con la piel:** Quitar inmediatamente la ropa contaminada. Lavar las zonas afectadas con abundante agua, y luego con más agua y jabón. **Contacto con los ojos:** Separando con los dedos los párpados, irrigar inmediatamente con solución colirio o agua limpia, durante 10 – 15 minutos. CONSULTAR CON UN MÉDICO Y MOSTRARLE LA ETIQUETA.

SÍNTOMAS: Se pueden presentar náuseas, vómito, diarrea y dolores abdominales.

TRATAMIENTO: Dar tratamiento sintomático y terapia de sostén.

TOXICIDAD: Categoría Toxicológica IV. Verde (cuidado).

EN CASO DE EMERGENCIA SI ESTÁ EN LAS PROVINCIAS DE: BOLÍVAR, CARCHI, CHIMBORAZO, COTOPAXI, ESMERALDAS, IMBABURA, NAPO, ORELLANA, PASTAZA, PICHINCHA, TUNGURAHUA Y SUCUMBÍOS LLAMAR A CISPROQUIM: 1-800593005 Ó (00571) 2886012. PARA EL RESTO DEL PAÍS: CISPROQUIM: (00571) 2886012 ó CIATOX a nivel nacional: 1800 836366.

REGISTRO N°: 077-F-SESA-U

Distribuido por: AGRIPAC